

NITRATOS EN EL IAM.

Nitroglicerina

Clase I:

- ✓ En las 1as. 24-48 hrs en pacientes con IC, IAM extenso, isquemia persistente o HTA.-
- ✓ Su uso mayor de 48 hrs en pacientes con angina recurrente o congestión pulmonar.-

Nitroglicerina

Clase III

- ✓ Paciente con PA menor de 90 MMHg o bradicardia severa (menor de 50 pm).-
- ✓ No deberían ser administrados en pacientes que han recibido un inhibidor de fosfodiesterasa por disfunción erectil en las ultimas 24 hs.

Contraindicaciones

- ❖ Estenosis Ao severa
- ❖ Miocardiopatía hipertrofica con obstr. dinámica IV
- ❖ IAM inferior con compromiso del VD

BETA BLOQUEANTES
EN EL
INFARTO DE MIOCARDIO CON
ELEVACION DEL SEGMENTO ST

BETA BLOQUEANTES

INDICACIONES: MANEJO HOSPITALARIO

- **CLASE I**

1. PTES QUE RECIBIERON BB DURANTE LAS PRIMERAS 24 HS SIN EFECTOS ADVERSOS DEBEN CONTINUARLO DURANTE LA FASE TEMPRANA DE CONVALESCENCIA (NE: A)
2. PTES SIN CONTRAINDICACIONES QUE NO RECIBIERON BB EN LAS PRIMERAS 24 HS DEBEN COMENZARLOS EN LA FASE TEMPRANA (NE: A)
3. PTES CON CONTRAINDICACIONES EN LAS PRIMERAS 24 HS DEBEN REEVALUARSE A FIN DE RECIBIR BB (NE: C)

IECA y ARA II

EN EL IAM

- La utilidad de los IECA en fases iniciales en pacientes con IAMST ha sido demostrado.
- El beneficio de la terapia con IECA es mayor en subgrupos de riesgo elevado (infarto de cara anterior, insuficiencia cardíaca, FE de VI disminuida y taquicardia)

Contraindicaciones:

- 1- Hipotensión Arterial (PAS < 100 mmHg)
- 2- Insuficiencia Renal con cifras sericas de creatinina > 2,5 mg/dl en el hombre y > 2,0 mgr/dl en la mujer
- 3- Hiperkaliemia (> 5 meq/l).